

Cecha N w czerniaku (AJCC 2016/UICC 2016)

Cecha N	Liczba metastatycznie dotkniętych węzłów chłonnych	Obecność przerzutów <i>in transit</i> , satelitarnych i/lub mikrosatelitarnych
Nx	Nie oceniano regionalnych węzłów chłonnych (np. wykonano biopsję wartowniczego węzła chłonnego, usunięto regionalne węzły chłonne w innym miejscu). W przypadku czerniaka sklasyfikowanego w klasyfikacji T1 klasyfikacja patologiczna (pN) nie jest obowiązkowa; należy stosować klasyfikację kliniczną (cN).	Nie
N0	Brak wykrywalnych przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.	Nie
N1	Przerzut w 1 węźle chłonnym; lub przerzuty <i>in transit</i> , satelitarne i/lub mikrosatelitarne.	
N1a	Klinicznie bezobjawowe przerzuty do 1 węzła chłonnego (np. zdiagnozowane przez biopsję wartowniczego węzła chłonnego).	Nie
N1b	Klinicznie widoczny przerzut w 1 węźle chłonnym.	Nie
N1c	Brak przerzutów do lokalnych węzłów chłonnych.	Tak

N2	Przerzuty w 2 lub 3 węzłach chłonnych; lub przerzuty <i>in transit</i> , satelitarne i/lub mikrosatelitarne z przerzutem w 1 węźle chłonnym.	
N2a	Klinicznie bezobjawowe mikroprzerzuty do 2 lub 3 węzłów chłonnych.	Nie
N2b	Przerzuty do 2 lub 3 węzłów chłonnych, w których co najmniej 1 węzeł chłonny został zdiagnozowany klinicznie.	Nie
N2c	Przerzut do 1 węzła chłonnego widoczny klinicznie lub nie.	Tak
N3	Przerzuty do 4 lub więcej węzłów chłonnych metastatycznie; Lub <i>In transit</i> , satelitarne i/lub mikrosatelitarne z 2 lub więcej z przerzutami do węzłów chłonnych; lub pakiet węzłów chłonnych BEZ przerzutów <i>in transit</i> , satelitarnych i/lub mikrosatelitarnych.	
N3a	Klinicznie bezobjawowe mikroprzerzuty do co najmniej 4 węzłów chłonnych.	Nie
N3b	Przerzuty do co najmniej 4 węzłów chłonnych, w których co najmniej 1 węzeł chłonny został zdiagnozowany klinicznie.	Nie
N3c	Przerzuty do 2 lub więcej węzłów chłonnych i/lub pakiet węzłów chłonnych.	Tak

Źródło: Wytyczne S3 dotyczące diagnostyki, terapii i opieki pooperacyjnej nad czerniakiem. Nr rejestru AWMF 032/0240L. Stan na 2018 r.